Krampfanfall – Kind

ABCDE-Herangehensweise

↓

Lagerung nach Bewusstseinslage, Schutz vor Verletzungen

↓

Andauernder Krampfanfall?

NEIN → **Ggf. stabile Seitenlage**

JA ↓

Schutz vor Verletzungen

↓

Auswahl Zugangsweg: intranasal oder rektal

↓

Intranasale Gabe möglich und Applikation situativ günstiger?

Midazolam (5 mg/1 ml) über Mucosal Atomization Device

Intranasal – KIND:

- < 10 kg KG (< 1 Jahr): 2,5 mg (0,5 ml)
- 10–20 kg KG: 5 mg (1,0 ml)
- > 20 kg KG: 10 mg (2,0 ml)

Rektale Applikation situativ günstiger?

Gabe von Diazepam rektal:

bis 3 Jahre (< 15 kg KG): 5 mg
ab 3 Jahre (> 15 kg KG): 10 mg

Ggf. Wiederholung nach 10 Minuten!

↓

Aspirationsschutz, ggf. stabile Seitenlage

↓

Fieberkrampf? Körpertemperatur > 38,5 °C

JA ↓

Paracetamol-Suppositorium

bis 1 Jahr: 125 mg
1–6 Jahre: 250 mg
> 6 Jahre: 500 mg

oder

Ibuprofen-Suppositorium

3 Monate bis 2 Jahre: 60 mg
ab 2 Jahre: 125 mg

NEIN ↓

↓

BZ-Messung, EKG, SpO_2, i.v.-Zugang – falls noch nicht geschehen

↓

Ggf. Algorithmus Hypoglykämie

↓

Ursachensuche: SHT, Intoxikation …

S1-Leitlinie 2021 – Fieberkrämpfe im Kindesalter – Gesellschaft für Neuropädiatrie (GNP); Fachinfo Ben-u-ron 125, 250, 500 mg

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V. (DBRD)